Gelbkörperinsuffizienz

nur ein reproduktionsmedizinisches
oder auch ein genetisches Problem?

Irene Sommerfeld-Stur
Institut für Tierzucht und Genetik
Veterinärmedizinische Universität Wien

Ist das erblich????

Eine häufige Frage

Gelbkörperinsuffizienz

- Klärung der genetischen Grundlage
- Züchterische Bekämpfung

Erbfehler

Jede Abweichung von der arttypischen phänotypischen Ausprägung eines Organismus, die das physische und/oder psychische Wohlbefinden eines Tieres sowie physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigt oder eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingt, und die eine genetische Grundlage hat.

Gelbkörperinsuffizienz

- Beeinträchtigung physiologischer Lebensabläufe ✓
- Genetische Grundlage ?

Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen

- **absolute Erbfehler:** die Erkrankung tritt unabhängig von der Umwelt auf
- **genetische Dispositionen:** der genetische Defekt allein führt zu keiner Erkrankung, erst die Kombination aus genetischer Krankheitsdisposition und belastenden Umwelteinflüssen führt zur phänotypischen Manifestation.

Begriffsbestimmungen

- **Rezessive Defektgene:** der Defekt manifestiert sich im Phänotyp nur dann, wenn ein Tier die Defektgene im homozygoten Genotyp trägt. Heterozygote Tiere sind phänotypisch gesund, geben aber das Defektgen an die Hälfte ihrer Nachkommen weiter

AA
gesund

A a
gesund

a a
krank

Begriffsbestimmungen

- **Dominante Defektgene:** der Defekt manifestiert sich im Phänotyp wenn ein Tier das Defektgen in homozygoter oder heterozygoter Form trägt.

AA
krank

A a
krank

a a
gesund

Begriffsbestimmungen

- **Monogene Defekte:** Erbfehler, die auf einem defekten Einzelgen beruhen
- **Polygene Defekte:** Erbfehler, die durch mehrere Genloci determiniert werden

Begriffsbestimmungen

- **Autosomale Defekte:** das oder die Defektgene liegen auf einem Autosom. Beide Geschlechter sind gleichmäßig betroffen
- **Geschlechtsabhängige Defekte**
 - Geschlechtsgekoppelte Defekte
 - Geschlechtsbegrenzte Defekte

Geschlechtsabhängigkeit

- **Geschlechtskopplung**

Gene liegen am Differenzierungssegment des X-Chromosomes, Merkmale treten nur bei einem oder bei beiden Geschlechtern auf.
- **Geschlechtsbegrenzung**

Gene liegen am Paarungssegment des X-Chromosoms oder auf Autosomen. Merkmal tritt phänotypisch nur bei einem Geschlecht auf. Betroffen sind geschlechtsspezifische Merkmale.

Geschlechtsbegrenzte Merkmale

Merkmal tritt phänotypisch nur bei einem Geschlecht auf, die genetische Information ist aber bei beiden Geschlechtern vorhanden

Selektionsmaßnahmen müssen daher beide Geschlechter umfassen

Beispiele:

Euterform

Milchleistung

Kryptorchismus

Gelbkörperinsuffizienz

Klärung der genetischen Grundlage

Hinweise auf genetische Grundlage

- Symptomatik
- Manifestationsalter
- Rassehäufung
- Familienhäufung
 - Pedigree Analyse
 - Erbgangsanalyse
 - Heritabilitätsschätzung

Rassehäufung

- Defekt tritt in einer Rasse häufiger auf, als in anderen Rassen
- Voraussetzung:
 - Repräsentative Stichprobe
 - Statistische Absicherung

Gelbkörperinsuffizienz wird besonders häufig beim Deutschen Schäferhund beobachtet

Pedigreeanalyse

Abklärung von Familienhäufungen

Ein Merkmalsträger

- Suche nach gleichen Ahnen auf der mütterlichen und väterlichen Seite des Pedigrees

Mehrere Merkmalsträger

- Suche nach gleichen Ahnen bei allen Merkmalsträgern
- Suche nach gleichen Ahnen auf der mütterlichen und väterlichen Seite des Pedigrees

AGRH Gießen 7.November.2009

Name : **BALOU VON GROISSENBRUNN**

Rasse : **Heilige Birma** **Farbe :** **seal point**

Zuchtbuchnummer : **KFG 2156/00 - 2301 - m**

<p>1.) Vater :</p> <p>Fernando von Elsandra Zuchtbuchnummer KFG 342/98-2302-m</p> <p>Rasse : Heilige Birma</p> <p style="text-align: right;">Farbe : blue point</p>	<p>3.) Ch. Midnight-Dream Pebbles</p> <p>Heilige Birma</p> <p>4.) Gina v. Schlossfürsteneck</p> <p>Heilige Birma</p> <p style="text-align: right;">Farbe : blue point</p>	<p>7.) Blue-Eye's Sir James</p> <p style="text-align: right;">Bir / seal tabby point</p> <p>8.) Midnight-Dream M... ..</p> <p style="text-align: right;">Bir / blue point</p> <p>9.) Bishoo v. Schlossfürsteneck</p> <p style="text-align: right;">Bir / blue point</p> <p>10.) Sita v. White Birmas</p> <p style="text-align: right;">Bir / seal point</p>
<p>2.) Mutter :</p> <p>Geraldine von Elsandra Zuchtbuchnummer KFG 508/98-2301-w</p> <p>Rasse : Heilige Birma</p> <p style="text-align: right;">Farbe : seal point</p>	<p>5.) Bishoo v. Schlossfürsteneck</p> <p>Heilige Birma</p> <p>6.) Helia von Mahendra</p> <p>Heilige Birma</p> <p style="text-align: right;">Farbe : seal tortie point</p>	<p>11.) Gr. Int. Ch. Vittorio v. Maymoon</p> <p style="text-align: right;">Bir / blue point</p> <p>12.) Sita v. White Birmas</p> <p style="text-align: right;">Bir / seal point</p> <p>13.) Eur. Ch. Sunny v.d. Niederheide</p> <p style="text-align: right;">Bir / seal tabby point</p> <p>14.) Las Perlas-ein Pandora</p> <p style="text-align: right;">Bir / blue ton...</p>

[back](#)

Eltern / Parents	Großeltern / Grand-parents	Urgroßeltern / Great-grand-parents
1. Vater Sire Père Dirk vom Denver Clan gew. 9.8.1990 9o 129o2	3 Goffy vom Denver Clan 89 1o675 (Reg.) 4 Cira von der Märchenwiese 834 512	7 Mc Lindow Albi F49o5oo33o7
		8 Fluffy Floppy Girl K25428o5Lo3
		9 Nero v.d.Rosenauer Hundestube 8o2 468 10 George's White Petricha 8o1 88o
2. Mutter Dam Mère Alice vom Denver Clan gew. 18.3.1987 87 54o8	5 Jockele vom Kerschbachtal 841o54	11 Highclair's Gillison 81o8/813163
	6 Hanni vom Julyhof 81o936	

Eltern / Parents	Großeltern / Grand-parents	Urgroßeltern / Great-grand-parents
1. Vater Père Goffy vom Denver Clan gew. 13.3.1987 89 1o675 (Reg.)	3 Mc Lindow Albi F 49o5oo33o7 Fluffy Floppy Girl K25428o5Lo3	7 Jock of the Ford
		8 Powder Puff of Armitage 9 Prince of Muirke 10 Supersonic Sally Girl
2. Mutter Dam Mère Mike vom Denver Clan gew. o1.8.1988 88 8438	5 Jockele vom Kerschbachtal 841o54	11 Highclair's Gillison 81o8/813163 12 Asta vom Traberhof 83 14456 IRJGV
	6 Hanni vom Julyhof 81o936	13 Aint Misbehaving of Rianza 88774/73 14 Sunnys Girl vom Birkenbuck DHS 75o27 Te

AG

Abbildung 5

Erbganganalyse

Rezessives Defektgen

AGRH Gießen 7.November.2009

Erbganganalyse

Dominantes Defektgen

AGRH Gießen 7.November.2009

Heritabilitätsschätzung

Vergleich väterlicher Halbgeschwister

- Tritt ein Defekt bei Nachkommen eines bestimmten Rüden häufiger auf als bei Nachkommen anderer Rüden ?

Züchterische Bekämpfung

Züchterische Bekämpfung

- Detektierung von Merkmalsträgern
- Detektierung von Anlagetragern
- Zuchtausschluss von Merkmalsträgern
- Zuchtausschluss von Anlagetragern
- Strategische Anpaarungen

Detektierung von Merkmalsträgern

- Zufallsbefund
- Screeninguntersuchung

Detektierung von Merkmalsträgern

Screening Untersuchung: standardisierte Reihenuntersuchung an klinisch unauffälligen Tieren

Klinische Untersuchung: individuelle Untersuchung von Tieren, die mit Krankheitssymptomen vorgestellt werden.

Zuchtscreening

Anforderungen an die Untersuchungsmethodik

- möglichst objektive Merkmalerfassung
- genau definierte Befundvarianten
- standardisiertes Untersuchungsverfahren
- möglichst frühzeitige Diagnose
- Untersuchungsergebnis soll aussagekräftig in Bezug auf die Erkrankung sein

Gelbkörperinsuffizienz beim Deutschen Schäferhund

- Hündinnen mit verkürztem Zyklus zeigten signifikant niedrigere Progesteronkonzentration
- Verkürzter Zyklus: Definition < 5 Monate

A.-R. Günzel-Apel et al. / Theriogenology 66 (2006) 1431–1435

AGRH Gießen 7.November.2009

Genetische Verschleierung

- Behandlung einer Gelbkörperinsuffizienz ermöglicht den Zuchteinsatz von Merkmalsträgern
- Mögliche Problemrelevante Gene bleiben in der Population

AGRH Gießen 7.November.2009

Detektierung von Anlageträgern

- Beachtung der Verwandten (Eltern, Nachkommen, Geschwister, Ahnen)
- Heterozygotietest
 - Anpaarung an Merkmalsträger
 - Anpaarung an bekannt heterozygote Tiere
 - Inzestpaarung
 - **automatischer Heterozygotietest**
- Zuchtwertschätzung (BLUP)
- Molekulargenetische Diagnostik

AGRH Gießen 7.November.2009

Detektierung von Anlageträgern

gesunder Vater

		gesund	krank
gesunde Mutter	gesund	gesund / gesund	gesund / krank
	krank	gesund / krank	krank / krank

Ein oder mehrere kranke Nachkommen weisen beide Elterntiere als genetisch belastet aus

AGRH Gießen 7.November.2009

Zuchtausschluss von Merkmalsträgern

Hündin mit
Gelbkörper-
insuffizienz

Zuchtausschluss von Anlagetägern

Vater

Mutter

Brüder

Hündin mit
Gelbkörper-
insuffizienz

Schwestern

Söhne

Töchter

Strategische Selektionsentscheidungen

- Jede Form von Selektion führt zu einer Einengung der genetischen Varianz
- Einzeltiere sollten immer als Gesamtes bewertet werden
- Fehler in Einzelmerkmalen können durch besondere Vorzüge in anderen Merkmalen kompensiert werden
- Selektionsstrategien sollten immer die Situation der Population berücksichtigen

Strategische Paarungen

- Vermeiden der Kombination von möglichen Anlagenträgern im Pedigree der Nachkommen
- Risikoschätzung
- Zuchtwertschätzung

Risikoschätzung

Das Risiko der Kombination von zwei rezessiven Defektgenen kann aus dem Generationenabstand von bekannten Vererbern auf der väterlichen und mütterlichen Seite des Pedigrees zum Probanden geschätzt werden

AGRH Gießen 7.November.2009

Risiko = $(\frac{1}{2})^8 = 0,4\%$

AGRH Gießen 7.November.2009

Zuchtwertschätzung

Bewertung der erwarteten Über- bzw. Unterlegenheit der Nachkommen eines Zuchttieres (Probanden) im Vergleich mit dem Populationsdurchschnitt auf der Basis der Phänotypen einer **repräsentativen** Stichprobe verwandter Tiere (Informanten)

Genauigkeit des Zuchtwertes

Abhängig von

- Heritabilität des Merkmals
- genetische Beziehung zw. Proband und Informant
- Anzahl und Repräsentativität der Informanten
- Genauigkeit der Prüfmethode
- Umwelteinflüsse.

Gelbkörperinsuffizienz

nur ein reproduktionsmedizinisches oder auch
ein genetisches Problem?

- Es gibt Hinweise auf eine genetische Grundlage
- Es gibt Ansätze zur Frühdiagnose
- Bei der Etablierung von züchterischen Maßnahmen ist auch die mögliche genetische Belastung männlicher Tiere zu berücksichtigen
- Therapeutische Maßnahmen verschleiern die mögliche genetische Belastung
- Selektionsmaßnahmen sollten immer unter Bedacht einer größtmöglichen Erhaltung genetischer Varianz in der Population geplant werden